

Písomná informácia pre používateľa

Panadol Migréna

250 mg/250 mg/65 mg filmom obalené tablety

kyselina acetylsalicylová/paracetamol/kofeín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa do 3 dní pri migréne a do 4 dní pri bolesti hlavy nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Panadol Migréna a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Migréna
3. Ako užívať Panadol Migréna
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Panadol Migréna
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Panadol Migréna a na čo sa používa

Každá tableta Panadolu Migréna obsahuje tri liečivá: kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín.

- Kyselina acetylsalicylová a paracetamol zmierňujú bolesť a znižujú horúčku a kyselina acetylsalicylová zmierňuje aj zápal.
- Kofeín je mierne povzbudzujúca látka a zvyšuje účinok kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.

Panadol Migréna sa používa na akútnu liečbu bolestí hlavy a záchvatov migrény (s príznakmi, ako sú: bolesť hlavy, nevoľnosť, precitlivenosť na svetlo a zvuk a funkčné postihnutie (stupeň neschopnosti vykonávať bežné denné činnosti)) s aurou (predzvestou) alebo bez nej.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Migréna

Neužívajte Panadol Migréna:

- **ak ste alergický (precitlivý) na kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek** Panadolu Migréna (uvedených v časti 6).
- **ak sa už niekedy v minulosti u vás vyskytla alergická reakcia** na iné **lieky proti bolesti, zápalu alebo horúčke**, ako je napríklad kyselina acetylsalicylová a salicyláty alebo akékoľvek iné protizápalové lieky známe ako NSAID ako je diklofenak alebo ibuprofén. Reakcie môžu zahŕňať astmu, sipot alebo dýchavičnosť, kožnú vyrážku alebo žihľavku, opuch tváre alebo jazyka, výtok z nosa. Ak si nie ste niečím istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- **ak máte vred žalúdka alebo čriev** alebo ak ste mali **v minulosti vred tráviaceho traktu (peptická ulcerácia)**.
- **ak ste v stolici zaznamenali krv alebo máte čiernu stolicu** (príznaky krvácania alebo perforácie čiže prederavenia tráviaceho traktu).
- **ak ste hemofilik alebo máte iné poruchy krvi.**
- **ak máte závažné srdcové, pečenné a obličkové problémy.**
- **ak užívate viac ako 15 mg metotrexátu týždenne** (pozri časť Iné lieky a Panadol Migréna).
- **ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva** (pozri časť Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť).

Upozornenia a opatrenia

Panadol Migréna obsahuje paracetamol. Neužívajte vyššiu než odporúčanú dávku, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie pečene.

Kyselina acetylsalicylová môže spôsobiť krvácanie. Musíte informovať lekára, ak sa u vás objaví nezvyčajné krvácanie.

Nižšie sú uvedené dôvody, pre ktoré môže byť Panadol Migréna pre vás nevhodný. Predtým, ako začnete užívať Panadol Migréna, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- **ak vám doposiaľ nebola stanovená diagnóza migrény**, pretože pred začatím liečby je potrebné vylúčiť potenciálne vážne stavy týkajúce sa mozgu alebo nervového systému.
- **ak máte migrénu**, ktorá je taká závažná, že si **vyžaduje pripútanie na lôžko**, alebo ak máte bolesť hlavy, ktorá sa odlišuje od obvyklej migrény alebo ak **pri migrenóznych bolestiach hlavy vraciate**.
- **ak vás začala bolieť hlava po alebo bola spôsobená úrazom hlavy, námahou, kašľom alebo v predklone.**
- **ak máte chronické bolesti hlavy** (viac ako 15 dní v mesiaci alebo dlhšie ako 3 mesiace) alebo ak ste pocítili bolesti hlavy po prvý raz po 50. roku života.
- **ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, podváhu alebo ste podvyživený** alebo pravidelne pijete alkohol. Možno bude potrebné vyhnúť sa užívaniu tohto lieku alebo obmedziť množstvo paracetamolu, ktoré užívate.
- **ak trpíte dedičným ochorením nazývaným nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy**, ktoré postihuje červené krvinky a mohlo by spôsobiť chudokrvnosť (anémiu), žltacku alebo zväčšenie sleziny pri určitých jedlách a

liekoch, akými sú niektoré protizápalové lieky (napr. kyselina acetylsalicylová) alebo pri súbežne prebiehajúcich iných chorobách.

- ak ste niekedy mali **žalúdočno-črevné problémy**, ako vred žalúdka, krvácanie alebo čiernu stolicu. Ak ste v minulosti trpeli žalúdočnými ťažkosťami alebo pálením záhy po užití liekov proti bolesti alebo protizápalových liekov.
- ak trpíte **poruchami krvácania alebo trpíte nie normálnym krvácaním z pošvy** mimo vášho menštruačného cyklu (napr. nezvyčajne silná alebo dlhotrvajúca menštruácia).
- ak ste nedávno podstúpili **chirurgický zákrok** (vrátane menej závažných zákrokov, ako je operácia zubov) alebo sa jej podrobíte počas nasledujúcich 7 dní.
- ak trpíte bronchiálnou astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi, chronickými **dýchacími chorobami alebo rozvinutými príznakmi alergie** (napr. kožná reakcia, svrbenie, žihľavka).
- ak trpíte dnou, cukrovkou, hypertenziou, arytmiou, nekontrolovaným vysokým krvným tlakom, máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene.
- ak máte problémy s **alkoholom** (pozri časť Panadol Migréna a jedlo a nápoje).
- ak práve teraz **užívate iné lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo paracetamolu** alebo iné lieky, ktoré by mohli zasahovať do účinku Panadolu Migréna a vyvolať jeho vedľajšie účinky (pozri časť Iné lieky a Panadol Migréna).
- ak vám hrozí **riziko dehydratácie** (napr. nevoľnosť, hnačka, stav pred veľkým chirurgickým zákrokom alebo po ňom).
- ak ste **mladší ako 18 rokov**. Vzhľadom na možné riziko Reyovho syndrómu v súvislosti s kyselinou acetylsalicylovou sa Panadol Migréna nemá podávať deťom a dospievajúcim.
Reyov syndróm je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže byť smrteľné. Z tohto dôvodu sa Panadol Migréna nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pokiaľ liečba nie je odporúčaná lekárom.

Počas liečby liekom Panadol Migréna ihneď informujte svojho lekára, ak:

- máte závažné ochorenia, vrátane závažnej poruchy funkcie obličiek alebo sepsy (keď sa v krvnom obehú nachádzajú baktérie a ich toxíny, čo vedie k poškodeniu orgánov), alebo ak trpíte podvýživou, chronickým alkoholizmom, alebo ak užívate aj flukloxacilín (antibiotikum). U takýchto pacientov bolo hlásené závažné ochorenie nazývané metabolická acidóza (abnormalita krvi a telesných tekutín), keď sa paracetamol užíval dlhodobo v pravidelných dávkach, alebo keď sa paracetamol užíval spolu s flukloxacilínom. Príznaky metabolickej acidózy môžu zahŕňať: závažné dýchacie ťažkosti s hlbokým rýchlym dýchaním, ospalosť, pocit nevoľnosti (nauzea) a nevoľnosť (vracanie).

Dalšie upozornenia

Rovnako ako pri iných typoch liekov proti bolesti hlavy, príliš časté užívanie Panadolu Migréna (čo znamená viac ako 10 dní za mesiac) spolu so súbežnými chronickými bolesťami hlavy (15 a viac dní za mesiac) po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, môže zhoršiť Vašu bolesť hlavy alebo migrénu. Ak si myslíte, že ide o Váš prípad, poraďte sa so svojím lekárom. Možno budete musieť prestať Panadol Migréna užívať, aby sa problém vyriešil.

Panadol Migréna môže zmierňovať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká teplota) a tým môže sťažiť jej diagnózu. Ak sa necítite dobre a potrebujete ísť k lekárovi, nezabudnite mu povedať, že užívate Panadol Migréna.

Panadol Migréna môže ovplyvniť výsledky laboratórnych testov. Ak máte podstúpiť vyšetrenie krvi, moču alebo iné laboratórne vyšetrenia, nezabudnite informovať lekára, že užívate Panadol Migréna.

Panadol Migréna obsahuje 0,03 mg kyseliny benzoovej (E 210) v jednej tablete. Kyselina benzoová môže zhoršiť novorodeneckú žltáčku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).

Iné lieky a Panadol Migréna

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte lekárovi, ak užívate lieky, najmä ak ide o niektorý z nižšie uvedených:

- akýkoľvek liek, ktorý obsahuje paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú alebo akýkoľvek liek na úľavu od bolesti alebo zníženie horúčky;
- **lieky proti zrážanlivosti krvi** („lieky na zriedenie krvi“), akými sú perorálne antikoagulanty (napr. warfarín), heparín, trombolýtika (napr. streptokináza) alebo iné antitrombotiká (napr. tiklopidín, klopidoogrel, cilostazol);
- **kortikosteroidy** (používané na zmiernenie zápalu);
- **barbituráty a benzodiazepíny** (na liečbu úzkosti a nespavosti);
- **lítium, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo fluvoxamín** (na liečbu depresie);
- **sulfonilmočovina a inzulín** (na liečbu cukrovky);
- **metotrexát** (na liečbu určitých druhov rakoviny, zápalu kĺbov alebo psoriázy);
- **niektoré lieky na liečbu infekcie** (napr. rifampicín, izoniazid, chloramfenikol, ciprofloxacín alebo kyselina pipemidová);
- **levotyroxín** (na liečbu zníženej funkcie štítnej žľazy);
- **metoklopramid** (na liečbu nevoľnosti a vracania);
- lieky na epilepsiu;
- **lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a zlyhania srdca;**
- **diuretiká** (na zvýšenie tvorby moču a zníženie nadmerného objemu tekutín, na tzv. „odvodnenie“);
- lieky na liečbu dny;
- **perorálne antikoncepčné lieky** (ústami podaná antikoncepcia);
- **zidovudín** (na liečbu HIV);
- **lieky na liečbu pomalého vyprázdňovania žalúdka**, akým je propantelín;
- **klozapín** (na liečbu schizofrénie);
- **sympatomimetiká** (na zvýšenie krvného tlaku alebo na liečbu upchatého nosa);
- **antialergiká** (na prevenciu alebo na úľavu od alergie);
- **teofylín** (na liečbu astmy);
- **terbinafín** (na liečbu plesňových infekcií);
- **cimetidín** (na liečbu pálenia záhy a vredov v tráviacom trakte);
- **disulfiram** (na liečbu závislosti od alkoholu);

- **nikotín** (na liečbu závislosti od fajčenia);
- **kolestyramín** (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu);
- **flukloxacilín** (antibiotikum) z dôvodu vážneho rizika abnormalít krvi a tekutín (nazývanej metabolická acidóza), ktorá sa musí urýchlene liečiť (pozri časť 2).

Panadol Migréna a jedlo a nápoje

- **Alkohol:** Ak konzumujete 3 alebo viac alkoholických nápojov každý deň, opýtajte sa lekára, či máte užívať tento liek alebo iné lieky na úľavu od bolesti a zníženie horúčky. Paracetamol a kyselina acetylsalicylová môžu spôsobiť poškodenie pečene a vyvolať žalúdočné krvácanie.
- **Kofeín:** Odporúčaná dávka tohto lieku obsahuje asi toľko kofeínu ako šálka kávy. Obmedzte príjem liekov, potravín a nápojov obsahujúcich kofeín, kým užívate tento liek, pretože priveľa kofeínu môže vyvolávať nervozitu, podráždenosť, nespavosť a príležitostne zrýchlený srdcový tep.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Užívanie tohto lieku počas tehotenstva sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, **oznámte to lekárovi a neužívajte Panadol Migréna.**

Tehotenstvo - posledný trimester

Neužívajte tento liek kvôli obsahu kyseliny acetylsalicylovej, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť vaše nenarodené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom u vášho nenarodeného dieťaťa. Môže ovplyvniť náchylnosť vás a vášho dieťaťa ku krvácaniu a spôsobiť, že pôrod bude neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo.

Tehotenstvo - prvý a druhý trimester

Kvôli obsahu kyseliny acetylsalicylovej nemáte tento liek užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné a ak vám to neodporučí váš lekár. Ak potrebujete liečbu počas tohto obdobia alebo kým sa pokúšate otehotnieť, má sa použiť najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Ak sa kyselina acetylsalicylová užíva dlhšie ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva, môže u vášho nenarodeného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami, ktoré môžu viesť k nízkej hladine plodovej vody obklopujúcej dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu cievy (*ductus arteriosus*) v srdci dieťaťa. Ak potrebujete liečbu dlhšiu ako niekoľko dní, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie sledovanie.

Neužívajte Panadol Migréna, ak dojčíte, pretože by mohol byť škodlivý pre vaše dieťa.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Panadol Migréna patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu zhoršovať plodnosť žien. Pri prerušení liečby sa tento účinok stratí.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by užívanie Panadolu Migréna zhoršovalo schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ak spozorujete u seba vedľajšie účinky, ako je závrat alebo ospalosť, vyhnite sa vedeniu vozidiel a obsluhu strojov. Čím skôr to oznámte lekárovi.

3. Ako užívať Panadol Migréna

Vždy užívajte Panadol Migréna presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí (vo veku 18 rokov a viac)

Pri liečbe bolesti hlavy:

Keď sa objavia príznaky bolesti hlavy, užite 1 tabletu a zapite ju plným pohárom vody. V prípade potreby môžete užiť ďalšiu tabletu o 4 až 6 hodín neskôr.

V prípade intenzívnejšej bolesti hlavy užite 2 tablety a zapite ich plným pohárom vody. V prípade potreby môžu byť podané ďalšie 2 tablety o 4 až 6 hodín neskôr.

Pri bolesti hlavy neužívajte Panadol Migréna dlhšie ako 4 dni bez konzultácie s lekárom.

Pri liečbe migrény:

Užite 2 tablety a zapite ich plným pohárom vody, keď sa objavia príznaky migrény alebo ak sa objaví migrenózna aura. V prípade potreby môžu byť podané ďalšie 2 tablety so 4 až 6-hodinovým odstupom medzi jednotlivými dávkami.

Ak sa do 2 hodín po prvej dávke 2 tabliet Panadolu Migréna nedostaví úľava od migrény, vyhľadajte lekára a požiadajte ho o radu.

Pri migréne neužívajte Panadol Migréna dlhšie ako 3 dni bez konzultácie s lekárom.

Pre obe – liečba bolesti hlavy a migréna neprekročte dávku 6 tabliet za 24 hodín. Toto zodpovedá dávke 1 500 mg kyseliny acetylsalicylovej, 1 500 mg paracetamolu, 390 mg kofeínu.

Dlhodobé užívanie bez lekárskeho dohľadu môže byť škodlivé.

Neužívajte viac, ako je stanovená dávka. Vždy užívajte najnižšiu účinnú dávku čo najkratší čas nevyhnutný na liečbu príznakov svojho ochorenia.

Deti a dospievajúci

Panadol Migréna nemajú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov (pozri časť Upozornenia a opatrenia).

Starší ľudia

Na dávkovanie sa nevzťahujú žiadne zvláštne odporúčania. Ak máte nízku telesnú hmotnosť, musíte sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Pacienti s problémami obličiek alebo pečene

Mali by ste informovať svojho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár vám môže nastaviť iný interval dávkovania alebo dĺžku liečby. Neužívajte Panadol Migréna, ak trpíte závažnými ťažkosťami pečene alebo obličiek.

Ak užijete viac Panadolu Migréna, ako máte

Tieto tablety obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín. Neužívajte vyššiu dávku, ako je odporúčaná a počas liečby Panadolom Migréna neužívajte iné lieky, ktoré môžu obsahovať tieto zložky alebo iné lieky proti bolesti, zápalu alebo horúčke (nesteroidové protizápalové lieky).

Vyhľadajte lekára, lekárnika alebo navštívte najbližšiu nemocnicu hneď, ako si uvedomíte, že ste možno užili nadmernú dávku. Okamžitá lekárska pomoc má rozhodujúci význam kvôli možnému nezvratnému poškodeniu pečene spôsobenému paracetamolom. Nečakajte, kým sa objavia príznaky, pretože predávkovanie sa spočiatku nemusí prejavíť nijakými zjavnými príznakmi.

Národné toxikologické informačné centrum (tel. +421 2 5477 4166 alebo +421 911 166 066, www.ntic.sk, ntic@ntic.sk).

Ak sa príznaky predávkovania rozvinú, môžu to byť:

- v súvislosti s **kyselinou acetylsalicylovou**: závraty, zvonenie v ušiach, ohluchnutie, potenie, hyperventilácia (rýchle dýchanie), horúčka, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, zmätenosť alebo nepokoj, zlyhanie krvného obehu alebo dýchania;
- v súvislosti s **paracetamolom**: prvými príznakmi, ktoré sa môžu objaviť, sú nevoľnosť, vracanie, strata chuti do jedla, bledosť, ospalosť, potenie, neskôr bolesť brucha;
- v súvislosti s **kofeínom**: úzkosť, nervozita, nepokoj, nespavosť, podráždenie, záškľby svalov, zmätenosť, kŕče, hyperglykémia, zvýšenie srdcovej činnosti (tachykardia), nepravidelný srdcový rytmus (arytmia).

Aj v prípade, že sa tieto príznaky predávkovania neobjavia alebo ak pominú, je mimoriadne dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Panadol Migréna

Vezmite si liek hneď, ako si to uvedomíte, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako 6 tabliet v priebehu 24 hodín.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Panadol Migréna môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Panadol Migréna a okamžite povedzte lekárovi, ak ste spozorovali niektorý z týchto závažných vedľajších účinkov:

- alergické reakcie s opuchom tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla;
To môže viesť k sťaženému prehltnutiu, sipotu, sťaženému dýchaniu, k stiesnenému pocitu na hrudi (príznaky astmy). Môže sa vyskytnúť tiež vyrážka alebo svrbenie a môžete omdlieť;
- začervenanie kože, plúzgier na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože alebo vredy v ústach;
- krvácanie žalúdka alebo čreva, vred žalúdka alebo čreva, čo môže byť sprevádzané prudkými bolesťami žalúdka, krvavou alebo čiernou stolicou prípadne vracaním krvi; tak ako pri všetkých liekoch proti bolesti a horúčke môže tento stav nastať kedykoľvek počas liečby, aj bez predchádzajúcej anamnézy a môže byť smrteľný; tento vedľajší účinok je zvlášť závažný u starších ľudí;
- zožltnutie kože alebo očí (príznaky poruchy pečene);
- závraty alebo točenie hlavy (príznaky nízkeho krvného tlaku);
- nepravidelný srdcový rytmus;
- ak ste mali problémy s dýchaním pri užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo nesteroidných protizápalových liekov a podobnú reakciu pocítujete pri tomto lieku;
- nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie;
- zvýšený výskyt krvácaní z nosa alebo podliatin;
- opuch alebo zadržiavanie vody v tele;
- zvonenie v ušiach alebo dočasná strata sluchu;
- zmeny v správaní, nevoľnosť a vracanie (môže to byť prejav Reyovho syndrómu).

Nižšie uvedené vedľajšie účinky boli zaznamenané v 16 klinických skúškach vykonaných s liekom Panadol Migréna u viac ako 4 800 liečených subjektov.

Informujte svojho lekára, ak ste zaznamenali niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- nervozita, závraty
- nevoľnosť, bolesť brucha

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- nespavosť, triaška, znížená citlivosť, bolesť hlavy
- sucho v ústach, hnačka, vracanie
- únava, pocit nervozity
- zvýšená frekvencia srdca

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- bolesť hrdla, sťažené prehltnutie, znížená citlivosť alebo trpnutie okolo úst, zvýšené slinenie
- znížená chuť do jedla, zmenená chuť
- strach, euforická nálada, napätie
- poruchy pozornosti, strata pamäte, zmenená koordinácia
- pocit bolesti v lícach a na čele
- bolesť okolo očí, poruchy videnia
- nával horúčavy, poruchy periférnych ciev (napr. v ramenách alebo v nohách)
- krvácanie z nosa, spomalené a sťažené dýchanie, výtok z nosa
- grganie, uvoľnenie vetrov (eruktácia, flatulencia)
- nadmerné potenie, svrbenie, vyrážka, zvýšená citlivosť kože
- stuhnutosť svalov, kostí alebo kĺbov
- bolesť krku, bolesť chrbta, svalové kŕče
- mdloba, tlak na hrudi

Nižšie uvedené vedľajšie účinky boli tiež zaznamenané od začiatku predaja Panadol Migréna.

Všeobecne, častota výskytu nežiaducich účinkov po uvedení na trh nemôže byť presne stanovená, preto sú tieto nežiaduce účinky uvedené ako „neznáme“:

- nepokoj, celkový pocit indispozície
- ospalosť, migréna
- začervenanie kože, vyrážka, vo veľmi zriedkavých prípadoch boli hlásené závažné kožné reakcie
- palpitácie (búšenie srdca), ťažkosti s dýchaním, náhle sťažené dýchanie a stiesnený pocit na hrudi s dýchavičnosťou alebo kašľom (astma)
- bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti po jedle
- zvýšenie pečeňových enzýmov
- opuch a podráždenie vnútri nosa
- problémy s obličkami
- závažné ochorenie, ktoré môže zvýšiť kyslosť krvi (nazývané metabolická acidóza) u pacientov so závažným ochorením, užívajúcich paracetamol (pozri časť 2)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Panadol Migréna

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Panadol Migréna po dátume expirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatulke po EXP.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Migréna obsahuje

- **Liečivá sú** kyselina acetylsalicylová, paracetamol, kofeín;
Jedna filmom obalená tableta obsahuje: 250 mg kyseliny acetylsalicylovej, 250 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu.
- **Ďalšie zložky sú:**
jadro tablety: nízkosubstituovaná hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza (E 460), kyselina stearová.
filmový obal: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), propylénglykol, kyselina benzoová (E 210), karnaubský vosk (E 903).

Ako vyzerá Panadol Migréna a obsah balenia

Panadol Migréna sú biele podlhovasté filmom obalené tablety s vyrazeným písmenom „E“ na jednej strane.

Tablety sa dodávajú v blistroch, ktoré sú balené v škatulkách po 10, 16, 20, 30 alebo 32 tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Haleon Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobca

Famar Italia S.P.A, Via Zambeletti, 25, 20021 Baranzate (MI), Taliansko
Haleon Germany GmbH, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Excedryn Migraine & Hoofdpijn, filmomhulde tabletten

Cyprus: Panmigran

Nemecko:	Paracetamol/ASS/Coffein Kopfschmerz & Migräne 250 mg/250 mg/65 mg Filmtabletten
Grécko:	Panmigran
Írsko:	Excedrin film-coated tablets
Luxembursko:	Excedryn Migraine & Maux de tête, comprimés pelliculés
Malta:	Panmigran
Holandsko:	Excedrin, filmomhulde tabletten
Poľsko:	Excedrin MigraStop
Portugalsko:	Voltamig
Slovenská republika:	Panadol Migréna
Španielsko:	Excedite 250 mg/250mg/65mg comprimidos recubiertos con película

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2025.